

# داروهای بخش اطفال

| دسته دارویی                            | نام داروها                                                               | منع مصرف                                                                            | عوارض جانبی و اقدامات احتیاطی                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>آنتی بیوتیک<br/>( سفالوسپورین )</b> | سفتریاکسون<br>سفتی زوکسیم<br>سفوتاکسیم<br>سفازولین<br>سفالکسین<br>سفکسیم | سابقه حساسیت<br>ابتلای به پورفیری<br>در نوزادان با سطح آلبومین کم<br>اسیدوز<br>زردی | راش پوستی، اسهال، درد ، پینه و احساس گرما در محل تزریق، خارش ، گرگرفتگی ،<br>سرگیجه ، سردرد ، تهوع<br>• اطلاع در صورت بروز اسهال<br>• در افراد با اختلال عملکرد کلیه و کبدی با احتیاط مصرف شود .                                           |
| <b>آنتی بیوتیک<br/>( بتالاکتام )</b>   | آمپی سیلین<br>آموکسی سیلین<br>کوآموکسی کلاو                              | سابقه حساسیت<br>مشکلات کبدی<br>مشکلات کلیوی<br>فنیل کتونوری                         | راش پوستی کهیری، تهوع و استفراغ، اسهال<br>• اطلاع در صورت بروز اسهال<br>• در زمان استفاده دارو واکسیناسیون انجام نشود مگر با مشورت پزشک                                                                                                    |
| <b>آنتی بیوتیک<br/>( پنی سیلین )</b>   | پنی سیلین جی<br>6.3.3<br>800<br>1200000                                  | سابقه حساسیت<br>آسم<br>مشکلات کلیوی<br>سابقه بیماری گوارشی<br>(کولیت)               | شوک آنافیلاکسی ، بثورات پوستی، تورم بخصوص در صورت و گلو ، اشکال در تنفس،<br>سرگیجه ، احساس ضعف، تهوع و استفراغ، اسهال<br>• رعایت رژیم غذایی پروتئین<br>• مصرف ویتامین ها ، مواد مغذی<br>• مصرف مایعات فراوان<br>• اطلاع در صورت بروز اسهال |

|                                                 |                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>آنتی بیوتیک<br/>( آمینوگلوکوزید )</b></p> | <p>آمیکاسین<br/>جنتامایسین</p> | <p>سابقه حساسیت<br/>اختلال عملکرد کلیه<br/>وزوز گوش<br/>کاهش شنوایی<br/>میاستنی گراو<br/>قند خون پایین در نوزادان و<br/>شیرخواران</p> | <p>وزوز گوش، کاهش شنوایی، مسمومیت کلیه، راش پوستی یا تاول، خارش، کهیر، تورم (چشم، صورت، گلو، زبان و لب )، مشکل در تنفس، مثل در بلع، خشنوت صدا، آسیب عصبی، تهوع و استفراغ، اسهال شدید، سردرد، تب</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اطلاع در صورت بروز اسهال</li> <li>در زمان استفاده دارو واکسیناسیون انجام نشود مگر با مشورت پزشک</li> <li>عدم مصرف همزمان با ایبوپروفن</li> <li>انجام آزمایشات کبدی و کلیوی در طول درمان</li> </ul>                                                                                 |
| <p><b>آنتی بیوتیک</b></p>                       | <p>کلیندامایسین</p>            | <p>سابقه حساسیت<br/>آسم<br/>مشکلات کبدی<br/>مشکلات کلیوی<br/>مشکلات گوارشی<br/>پورفیری</p>                                            | <p>اسهال، احساس ناراحتی در شکم، تهوع و استفراغ، کولیت، بثورات پوستی، زردی</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اطلاع در صورت بروز اسهال</li> <li>در زمان استفاده دارو واکسیناسیون انجام نشود مگر با مشورت پزشک</li> <li>انجام آزمایشات کبدی و کلیوی در طول درمان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>آنتی بیوتیک</b></p>                       | <p>ونکومایسین</p>              | <p>سابقه حساسیت<br/>سابقه مشکلات شنوایی<br/>مشکلات کبدی<br/>مشکلات کلیوی<br/>بیماری های التهابی روده</p>                              | <p>هایپوکالمی، دل درد، تهوع، اسهال آبکی یا خونی، کاهش شنوایی، زنگ زدن در گوش، مشکلات کلیوی، تورم، افزایش سریع وزن، درد در ناحیه پهلو یا کمر، ادرار کم یا بدون ادرار، گرفتگی عضلات پا، یبوست، ضریان قلب نامنظم، بال زدن در قفسه سینه، افزایش تشنگی، بی حسی یا گزگز، ضعف عضلانی یا احساس لنگیدن</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اطلاع در صورت بروز اسهال</li> <li>مصرف مایعات فراوان</li> <li>انفوزیون آهسته وریدی ( 90-60 دقیقه )</li> <li>در زمان استفاده دارو واکسیناسیون انجام نشود مگر با مشورت پزشک</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p>مشکلات تنفسی، ورم صورت یا لب ، تیرگی یا کاهش حجم ادرار، شکم درد شدید، خستگی زیاد، زردی شدید صورت و چشم، تهوع و استفراغ ، اسهال همراه با درد شکم</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اطلاع در صورت بروز اسهال</li> <li>مصرف مایعات فراوان</li> </ul>                                                                                                                                                                                | <p>سابقه حساسیت<br/>مشکلات کبدی<br/>مشکلات کلیوی<br/>فاویسم</p>                                           | <p>استامینوفن<br/>( پاراستامول ، آپوتل )</p> | <p><b>ضد التهاب</b><br/><b>مسکن، تب بر</b></p>                          |
| <p>درد معده، سوزش سر دل، نفخ شکم، اسهال یا یبوست، خونریزی و زخم معده، حالت تهوع و استفراغ، مشکلات کلیوی ، تورم مچ پا-لب- زبان- چشم، تنگی نفس، خس خس سینه، اشکال در بلع، کهیر، کبودی یا خونریزی در پوست</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>رعایت رژیم غذایی سبک</li> <li>مصرف مایعات فراوان</li> <li>اطلاع در صورت بروز اسهال</li> </ul>                                                                                              | <p>سابقه حساسیت<br/>آسم<br/>مشکلات کبدی<br/>مشکلات کلیوی<br/>مشکلات گوارشی<br/>کولیت اولسراتیو</p>        | <p>دیکلوفناک<br/>ایبوبروفن</p>               | <p><b>ضد التهاب غیر</b><br/><b>استروئیدی</b><br/><b>مسکن، تب بر</b></p> |
| <p>خواب آلودگی ، آتاکسی ، سرگیجه ، اشکال در تکلم، درد و فلجیت محل تزریق، کلاپس قلبی عروقی، برادیکاردی، دیس ریتمی، دوبینی، تاری دید، حساسیت به نور، نیستگموس، دپرسیون تنفسی ، اختلال عملکرد کبدی، احتباس ادراری ، یبوست ، بی اشتهایی ، طمع فلز در دهان ، تغییر در ترشح بزاق</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تخت حفاظ داشته باشد.</li> <li>بررسی علائم حیاتی بخصوص ریت تنفسی</li> <li>عدم مصرف با داروهای آنتی هیستامینی</li> </ul> | <p>سابقه حساسیت<br/>مشکلات کبدی<br/>مشکلات کلیوی<br/>گلوکوم زاویه بسته<br/>شوک<br/>کودک کمتر از 6 ماه</p> | <p>دiazپام</p>                               | <p><b>بنزودیازپین ها</b><br/><b>ضد اضطراب</b><br/><b>ضد تشنج</b></p>    |

|                              |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ضد صرع</p> <p>ضد تشنج</p> | <p>فنی توئین</p>  | <p>سابقه حساسیت<br/>برادیکاردی سینوسی<br/>بلوک دهلیزی بطنی و S<br/>A<br/>سندرم استوک آدامز</p> | <p>سردرد، بی خوابی، سرگیجه، آتاکسی، پرش عضلانی، تحریک پذیری، لکنت زبان، از دست رفتن تعادل، حرکات غیر نرمال چشم تهوع، استفراغ، خشکی دهان، هایپرپلازی لثه، یبوست، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی، سندرم استیون جانسون، حساسیت به نور، درماتیت، دو بینی هایپرگلاسمی، لنفودنوباتی</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• توجه به علائم استیون جانسون</li> <li>• بررسی ریت، ریتم و الگوی تنفسی</li> <li>• انجام آزمایشات CBC و آلبومین</li> <li>• بررسی ABG</li> <li>• تخت حفاظ داشته باشد</li> <li>• بررسی وضعیت ذهنی</li> </ul> |
| <p>ضد تشنج</p>               | <p>فنوباریتال</p> | <p>سابقه حساسیت<br/>بیماری کبدی مزمن<br/>مشکلات کلیوی<br/>بیماری های قلبی</p>                  | <p>خواب آلودگی و کاهش تمرکز، برادیکاردی، کلاپس عروقی، دپرسیون تنفسی، آپنه، خشکی دهان، سردرد، گیجی و سرگیجه، تهوع و استفراغ، افزایش اشتها و وزن، تحریک و بیقراری، تغییرات خلقی و روانی، حساسیت به نور، مشکلات خواب و بیداری، اریتم مولتی فرم ، سندرم استیون جانسون</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• توجه به علائم استیون جانسون</li> <li>• بررسی ریت، ریتم قلبی - تنفسی</li> <li>• تخت حفاظ داشته باشد</li> <li>• عدم مصرف همزمان با استامینوفن</li> </ul>                                                     |

|                        |                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ضد تهوع</p>         | <p>اندانسترون</p>            | <p>سابقه حساسیت<br/>بیماری های قلبی</p>         | <p>آنافیلاکسی، سردرد، سرگیجه، یبوست، اضطراب، خواب آلودگی، هایپوکسی</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• بررسی ریت، ریت قلبی</li> <li>• ECG و بررسی فاصله QT</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| <p>برونکودیلاتور</p>   | <p>سالبوتامول</p>            | <p>سابقه حساسیت</p>                             | <p>لرزش، تپش قلب، هایپو کالمی، اضطراب، درد عضلانی، اختلال خواب، سردرد، تهوع و استفراغ، ورم ملتحمه، خشکی دهان، تورم گلو و زبان، اشکال در بلع</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• بررسی ریت، ریت قلبی</li> <li>• انجام آزمایش K-CR</li> <li>• مصرف با احتیاط در افراد مبتلا به اختلالات تیروئیدی، دارای سابقه بیماری قلبی و تشنج</li> <li>• بررسی ABG</li> </ul> |
| <p>کورتیکواستروئید</p> | <p>بودزوناید (پالمیکورت)</p> | <p>سابقه حساسیت<br/>سل ریوی</p>                 | <p>تهوع و استفراغ، اسهال، درد شکمی، کونژنکتیو چشمی، گرفتگی صدا، کاندیدیاز</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• شستشوی دهان با آب</li> <li>• در زمان استفاده دارو واکسیناسیون انجام نشود مگر با مشورت پزشک</li> <li>• عدم مصرف گریپ فروت در طول مدت درمان</li> <li>• انجام معاینات چشمی</li> </ul>                                                               |
| <p>برونکودیلاتور</p>   | <p>هیدروکورتیزون</p>         | <p>سابقه حساسیت<br/>عفونت سیستمیک<br/>قارچی</p> | <p>آریتمی قلبی، نارسایی قلبی، سردرد، گزگز اندامها، سرگیجه، قرمزی پوست، خشکی پوست، هایپوکالمی</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• انجام آزمایش K-CR</li> <li>• مصرف با احتیاط در افراد مبتلا به اختلالات تیروئیدی، دارای سابقه بیماری قلبی و تشنج</li> <li>• مصرف غذاهای حاوی پتاسیم</li> </ul>                                                                 |