

نام دارو	دسته دارویی	عوارض جانبی و اقدامات احتیاطی
سفترياکسون کفلین	آنتی بیوتیک درمان عفونت های باکتریایی پیشگیری از عفونت در عمل های جراحی	اطلاع در صورت علایم حساسیت (کهیر ، تنگی نفس ، تورم صورت و اندام ها ، تب ، گلودرد، سوزش در چشم ، بثورات پوستی) اطلاع در صورت سابقه حساسیت به سایر آنتی بیوتیک ها در گذشته
کفلین	آنتی بیوتیک درمان عفونت های باکتریایی پیشگیری از عفونت در عمل های جراحی	اگر مبتلا به دیابت هستید ، اگر سابقه ی بیماری کلیوی و کبدی دارید ، اگر سابقه ی حساسیت دارویی به سایر آنتی بیوتیک ها داشته اید، اگر سابقه ی تشنج داشتید ، اگر مشکلات خونریزی دارید. پزشک را مطلع کنید. علایم حساسیت پوستی و تنفسی را گزارش کنید.
کلیندامایسین	آنتی بیوتیک درمان عفونت های باکتریایی پیشگیری از عفونت در عمل های جراحی	ممکن است دچار اسهال شوید . ممکن است طعم فلز را در دهان احساس کنید. این موارد را اطلاع دهید: -اگر دچار اسهال آبکی یا خونی شدید -اگر بیماری کولیت یا سایر اختلالات روده ای دارید -سابقه ی حساسیت به آسپرین -واکنش های حساسیتی پوستی و تنفسی حین دریافت دارو

مترونیدازول	آنتی بیوتیک -درمان عفونت های باکتریایی در واژن ، معده ، کبد ، پوست ، مغز ، ریه ، قلب و استخوان ها -درمان اول عفونت مقاربتی تریکومونیازیس	اگر درسه روز اخیر الکل مصرف کرده اید اطلاع دهید همچنین حداقل تا سه روز پس از اتمام درمان با مترونیدازول الکل مصرف نکنید زیرا ممکن است دچار تشنج شوید. هر گونه علایم سیستم عصبی حین مصرف این دارو مثل سردرد، تشنج ، مشکلات بینایی ، بیحسی یا گزگز اندام را گزارش کنید.
سیپرو فلوکساسین	آنتی بیوتیک -درمان عفونت های باکتریایی در سیاه زخم ، طاعون و همچنین عفونت هایی که با سایر آنتی بیوتیک ها درمان نشده است.	این دارو ممکن است تغییراتی در سیستم عصبی ، مفاصل، خلق و خو و میزان قند خون ایجاد کند. در صورت مشاهده ی این عوارض مصرف دارو را متوقف کنید : بی حسی و گزگز و درد در بدن ، مشکلات حرکتی و مفصلی ، بیقراری ، تحریک پذیری ، گیجی، بد بینی ، افکار خود کشی ، مشکلات حافظه و تمرکز - اگر سابقه ی میاستی گراویس دارید پزشک را مطلع کنید. - اگر دچار درد شدید قفسه سینه و کمر و پشت شدید فوراً اطلاع دهید.

آزیترومایسین	آنتی بیوتیک -درمان انواع عفونت های باکتریایی مثل عفونت گوش و چشمو دستگاه تنفس و بیماری های عفونی مقاربتی و	اطلاع به پزشک در صورت : اگر به داروهای مشابه مثل اریترو مایسین و کلاریترو مایسین و تلیترو مایسین حساسیت داشته اید. زردی و مشکلات کبدی مشکلات کلیوی میاستی گراویس نا منظمی در ریتم قلب پتاسیم خون پایین
استامینوفن	مسکن ضد درد ، ضد تب ، ضد التهاب مورد استفاده در انواع دردهای خفیف تا شدید گاهی با مخدر ترکیب میشود (مثل کدئین)	علایم حساسیت را گزارش دهید : قرمزی و انواع بثورات پوست ، ورم و صورت و گلو ، تنگی نفس و... از مصرف بیش از حد این دارو بعلت آسیب به کبد پرهیز کنید. مشکلات معده ، ادرار تیره و تغییر رنگ مدغوع حین مصرف استامینوفن را گزارش کنید.
دیکلوفناک	مسکن ضد درد ، ضد تب ، ضد التهاب موارد مصرف : درد های قاعدگی ، سردرد میگرنی و	در بیماران قلبی و افرادی که سابقه جراحی قلب داشته اند مصرف نشود. علایم خونریزی معده و روده گزارش شود .

کترولاک	مسکن ضد درد ، ضد تب ، ضد التهاب	در این موارد مصرف نشود: بیماری کلیوی شدید خونریزی معده مشکلات انعقادی سابقه ی حساسیت به آسپرین سابقه ی جراحی قلب
پنتاپرازول امپرازول	آنتی اسید باعث کاهش اسید معده میشود. - سوزش سر دل - ریفلاکس معده - زخم گوارشی غیر سرطانی - عفونت هلیکو باکتر معده	در مصرف طولانی مدت باعث کاهش ویتامین B12 میشود. در صورت کاهش دفع ادرار ، خون در ادرار و اسهال آبکی و خونی اطلاع دهید. اگر لوپوس دارید پزشک را مطلع کنید.
کلیدینیوم سی	ترکیب کلیدینیوم و کلردیازپوکساید درمان اسپاسم روده روده تحریک پذیر ناراحتی های عصبی دستگاه گوارش	احتمال تضعیف تنفس در صورت مصرف همزمان مخدر و الکل در صورت قطع ناگهانی دارو و بروز علائم تغییر خلق و خو ، گیجی و حرکات غیر طبیعی ماهیچه ها اطلاع دهید.

دمپريدون	ضد استفراغ درمان مشکلات معده مانند حالت تهوع ، درد و نارحتی در معده که ناشی از کاهش حرکات دستگاه گوارش فوقانی میباشد.	باعث حرکت آسان غذا در دستگاه گوارش میشود. ممکن است دچار اسهال شوید. با افزایش پرولاکتین خون ممکن است باعث تولید شیر یا درد در پستان شود. خشکی دهان عارضه شایع است.
هیوسین	درمان اسهال موجب کاهش حرکات دستگاه گوارش میشود. درمان زخم های گوارشی درمان اسپاسم عضلانی دستگاه گوارشی ، کیسه صفرا و سیستم ادرار	برای عارضه ی خشکی دهان مایعات بیشتر مصرف کنید یا ابنبات بمکید. بهداشت دهان را رعایت کنید. برای پیشگیری از کم اب شدن بدن در معرض هوای خیلی گرم قرار نگیرید مایعات کافی بنوشید
انداسترون	ضد تهوع و استفراغ	از فعالیت هایی که نیاز به هوشیاری کامل دارد پرهیزید. تاری دید و مشکل در بینایی ، احساس بیهوش شدن، بیقراری ، کاهش ضربان قلب ، تنفس ضعیف از عوارض جدی است دارو را در صورت مشاهده این عوارض قطع کنید. در افراد مبتلا به فنیل کتون اوری مصرف نشود.

متوکلوپرامید	باعث افزایش انقباضات عضلانی دستگاه گوارش فوقانی میشود. درمان سوزش سر دل ناشی از رفلاکس معده درمان مشکل تخیله ی کند معده	در صورت انسداد یا خونریزی یا پارگی معده و روده نباید مصرف شود. در صورت اختلالات تشنج ، صرع و تومور غده فوق کلیه استفاده نشود. دوز های بالا و همچنین مصرف طولانی مدت عوارض خطرناکی دارد.
متورال	برای درمان فشارخون بالا یا نارسایی قلبی یا کنترل ضربان نامنظم یا آنژین می باشد. باعث ریلکس شدن عضلات قلب و کاهش ضربان قلب و کاهش نیاز عضله قلب به اکسیژن می شود. از قلب در برابر استرس و ضربان قلب غیر نرمال محافظت می کند . از آنژین صدری جلوگیری می کند	نبض کمتر از 60، اندام های سرد، فشار خون پایین، اسهال ، حالت تهوع، سرگیجه، خستگی از عوارض خفیف آن می باشد که معمولا این عوارض با گذشت زمان از بین می رود . در صورت سابقه آسم پزشک را مطلع کنید. در صورت بروز مشکلات تنفسی، تورم پاها ، افسردگی و کابوس با پزشک مشورت کنید. از قطع ناگهانی دارو پرهیز کنید. ممکن است در طول مصرف میزان قند خون را بطور کاذب تغییر دهد

آسپرین	از چسبیدن پلاکت به هم و تشکیل لخته جلوگیری می کند. از استنت ها در برابر لخته محافظت می کند.	-همراه غذا مصرف شود. -ممکن است عوارض زخم گوارشی، خونریزی معده و کبودی های در بدن ایجاد کند. -از مصرف همزمان مسکن هایی مثل ایبو پروفن و دیکلوفناک بدون تجویز پزشک پرهیز شود -در صورت مشکل قلبی تا پایان عمر مصرف شود.
نیترو گانتین	برای پیشگیری و یا کنترل آنژین می باشد. با شل کردن رگ های خونی به ویژه در شریان های قلب موجب افزایش اکسیژن رسانی به عضله قلب می شود.	هنگام مصرف در حالت نشسته یا خوابیده قرار بگیرید. -در مصرف داروهای درمان اختلال جنسی (ویاگرا، رواتیو، تدا لافیل) با پزشک مشورت کنید زیرا ممکن است موجب کاهش فشار خون شدید و دید غیر طبیعی شود. قرص های پرل زیر زبانی حتما در بسته بندی نگه داری شود. دور از نور و رطوبت حفظ شود
سالبوتامول	راه های هوایی را آرام و باز میکند درمان تنگی نفس ، خس خس، سرفه ، آسم بیماری انسداد مزمن ریه	در صورت بدتر شدن تنفس پس از مصرف سالبوتامول فوراً پزشک را مطلع کنید. در صورت سابقه مشکلات قلبی ، ریتم نامنظم ضربان قلب و آنژین پزشک را مطلع کنید.

بکلو متازون	استروئید استنشاقی، درمان آسم	در صورت عفونت های باکتریایی ، قارچی یا ویروسی ، بیماری سل ، تبخال ، سیستم ایمنی ضعیف ، پوکی استخوان ، آب مرواید و فشار داخل چشم پزشک را مطلع کنید.
دیفن هیدرامین	ضد آلرژی علایم حساسیت (سرفه، آبریزش بینی ، آبریزش چشم ، بثورات پوستی، خارش) را کاهش میدهد. القا خواب در پارکینسون	بعلت ایجاد خواب آلودگی و سرگیجه از فعالیت هایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند پرهیزید. از مصرف همزمان الکل با این دارو پرهیزید. نباید از دیفن هیدرامین برای خواب کردن کودک استفاده کرد.
تئوفیلین جی	گشاد کننده برونش در درمان آسم، برونشیت ، آمفیزم و سایر مشکلات تنفسی	بیش از دوز تجویزی مصرف نکنید. در صورت بدتر شدن تنفس به پزشک اطلاع دهید.
آلپرازولام	بنزودیازپین ضد اضطراب، شل کننده عضلانی ، آرام بخش و خواب آور	استفاده نادرست این دارو موجب اعتیاد میشود. طبق دستور مصرف کنید و از قطع ناگهانی دارو پرهیز کنید. مصرف همزمان با الکل و مخدر و سایر خواب اور ها موجب ضعف تنفس و خطرناک است.

متفورمین	درمان دیابت کاهنده قند خون	برای کنترل قند خون در افراد دیابتی بهتر است و رژیم درمانی و فعالیت بدنی نیز با مصرف متفورمین توأم شود. قبل از عمل جراحی و انجام تصویر برداری های با تزریق ماده حاجب پزشک را مطلع کنید تا از قبل مصرف این دارو را برایتان متوقف کند. حتما همراه غذا مصرف کنید. علائم کاهش قند را بدانید: تعریق سرد ، سرگیجه و بیحالی اگر دچار درد عضلانی غیر معمول شده اید و مشکل تنفس نیز دارید ممکن است دچارکتواسیدوز دیابتی شده باشید از مصرف متفورمین در این شرایط پرهیز کنید و فوراً به پزشک مراجعه کنید تا بررسی های بیشتر انجام شود.
------------------------	---------------------------------------	---

بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

داروهای شایع بخش داخلی

تهیه کننده : عالیہ مسعودی

منبع : drugs.com