

تذکرات مهم قبل از آندوسکوپی ویا کولونوسکوپی

۱. در صورت مصرف قرص آسپرین، وارفارین، هپارین، پلاویکس، اسویکس، آناکساپرین و یا سایر داروهای ضد انعقاد خون، حتما به پزشک خود اطلاع دهید تا راهنمایی لازم را دریافت کنید.
 ۲. در صورتی که به بیماری های مثل هیپاتیت یا ایدز مبتلا هستید ، حتما پیش از انجام آندوسکوپی این موارد را به پزشک خود و یا پرستار اطلاع دهید. چرا که پزشکان به منظور پیشگیری از انتقال این بیماری های از یک فرد به فرد دیگر، برای مبتلایان به این بیماری ها از اندوسکوپ های مخصوص این بیماران استفاده می کنند.
 ۳. بیماران جهت انجام آندوسکوپی و کولونوسکوپی از ساعت ۱۲ شب ناشتا باشند.
 ۴. تمامی افراد بالای 06 سال وافرادی که ابتلا به هر گونه بیماری زمینه ای یا قلبی هستند قبل از انجام آندوسکوپی در روز آندوسکوپی از متخصص قلب مجوز انجام آندوسکوپی بگیرند.
 ۵. اگر بیمار، به هر علت هر بیماری ، دارویی مصرف می کند پزشک و پرستار را در جریان بگذارید.
 ۶. از زمان پذیرش تا زمان دریافت پاسخ حدود 3 ساعت طول می کشد . لطفا وقت خود و همراهانتان را تنظیم نمایید.
 ۷. با توجه به ناشتا بودن در روز آندوسکوپی داروهای قند خون و انسولین مصرف نشود و داروهای قلبی و فشار خون با تایید پزشک و دستور پزشک مصرف شود.
 ۸. پس از انجام آندوسکوپی، و کولونوسکوپی اگر بیمار دچار هر مشکلی نظیر خونریزی، درد بیش از حد، تهوع و استفراغ یا تب شد، هر چه سریعتر مساله را با پزشک خود در میان بگذارد.
 ۹. حضور یک نفر همراه بیمار و مدارک پزشکی هنگام مراجعه الزامی است.
 ۱۰. بعد از انجام آندوسکوپی ویا کولونوسکوپی رانندگی ممنوع است.
 ۱۱. در صورتی که باردار هستید، اطلاع دهید.
 ۱۲. از به همراه آوردن طلا و اشیا قیمتی جدا خودداری کنید
 ۱۳. در صورت عدم تمایل به حضور حتما یک روز قبل از طریق تلفن بیمارستان اطلاع دهید تا حتی الامکان بیماران دیگر جایگزین گردند
 ۱۴. در صورت داشتن کولونوسکوپی داروهای زیر را از داروخانه تهیه فرمایید و طبق دستور برگه امادگی کولون استفاده نمایید
- ۶ عدد پودر پیدرولاکس ۲ عدد شیباف بیزاکودیل ۲ عدد قرص بیزاکودیل ۱ عدد شربت کرچک

مراقبت های بعد از انجام آندوسکوپی و یا کولونوسکوپی

۱. بعد از انجام آندوسکوپی و یا کولونوسکوپی و رفع اثر داروی بیهوشی و در صورت هوشیاری کامل میتوانید رژیم مایعات و در صورت تحمل سپس معمولی شروع نمایید.

۲. ممکن است بعد از آندوسکوپی گلو درد خفیف داشته باشید که با مصرف مایعات گرم . غرغره کردن آب نک برطرف میشود

۳. در صورت تهوع و استفراغ شدید تب یا خونریزی یا مدفوع سیاه رنگ سریع به اورژانس مراجعه کنید و به پزشک خود اطلاع دهید.

۴. بعد از انجام آندوسکوپی و یا کولونوسکوپی از کارهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند مثل رانندگی پرهیزید.

۵. برای راهنمایی و اطلاعات بیشتر حتما کد یو آر تی را هنگام ترخیص از بخش آندوسکوپی تهیه فرمایید.

باتشکر

مسئول بخش آندوسکوپی