



دانشگاه علوم پزشکی سمنان
بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

عنوان:

در مورد آندوسکوپي دستگاه گوارش چه می دانید

تهیه شده در کارگروه آموزش بخش آندوسکوپي

تاریخ تنظیم: 1402/12/01

تاریخ بازنگری: 1404/12/1

کد پمفلت: Hos-pam-OS1

مراقبت‌های بعد از آندوسکوپي

*به دلیل بیحسی موضعی در قسمت حلق و خطر آسپیراسیون مواد به داخل ریه حداقل 1-2 ساعت بعد از انجام آندوسکوپي (تا برگشت رفلکس بلع) از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید.

*بهتر است غذا خوردن را با غذاهایی نرم و ملایم شروع کنید و تا زمانی که درد گلو بهبود یابد آنرا ادامه دهید.

*از آنجا که حین آندوسکوپي آرام بخش به شما تزریق می شود لازم است حدود 2 ساعت بعد از آندوسکوپي استراحت کنید و تا 12 ساعت از رانندگی خودداری کنید.

*ناراحتی جزئی در گلو با غرغره کردن با سرم نمکی گرم و یا مسکن خوراکی قابل رفع می باشد.

*در زمان مقرر جهت دریافت نتیجه پاتولوژی مراجعه کنید و آنرا به رویترزکتان برسانید تا ادامه درمان انجام گیرد.

*در صورتی که طی 24-72 ساعت دچار درد شدید شکمی تب لرز و یا خونریزی (استفراغ خونی یا مدفوع تیره رنگ) اشکال در بلع و بلع دردناک و یا مشکلات تنفسی شدید باید سریعاً به مرکز درمانی مراجعه نمایید.

اشکالاتی که ممکن است در حین انجام آندوسکوپي برای شما ایجاد شود عبارتند از:

احساس فشار در گلو و گاهی اوقات احساس ناراحتی در شکم و آورغ زدن به خاطر هوایی که داخل معده فرستاده می شود.

در هنگام داخل کردن نوک آندوسکوپ به سمت گلو ممکن است شما کی دو بار آورغ بزنید که این یک واکنش طبیعی است

آمادگی قبل از آندوسکوپي

*قبل از انجام آندوسکوپي معده باید خالی باشد 8 ساعت قبل از آندوسکوپي نباید چیزی بخوری یا بیاشامید.

*مصرف هرگونه دارو (به عنوان مثال ضد انعقادها) را به پزشک اطلاع دهید.

*اگر بیماری خاصی مثل قلبی ریوی و.... دارید حتماً پزشک خود را مطلع کنید

*در صورت داشتن دندان مصنوعی و یا لنز چشمی آن را خارج کنید.

آندوسکوپي

آندوسکوپي دستگاه گوارش روشی است که به پزشک اجازه می دهد قسمت داخل مری معده دوازده (قسمت اول روده باریک) به طور مستقیم مورد معاینه قرار گیرد. تهیه تصاویر برای ثبت اطلاعات و تهیه نمونه بافتی ترشحات نیز با این روش قابل انجام است این روش حدوداً 30 دقیقه طول می کشد.

در آندوسکوپي لوله نسبتاً نازک دراز و قابل انعطاف را که به یک منبع نوری متصل است پس از بی حس نمودن دحلق با اسپری بی حس کننده از راه دهان وارد دستگاه گوارش می نمایند و از این طریق امکان بررسی قسمتهای مختلف دستگاه گوارش فوقانی به وجود می آید.

موارد انجام آندوسکوپي

آندوسکوپي بهترین روش برای بررسی علت های خونریزی فوقانی دستگاه گوارش است . سایر موارد انجام آندوسکوپي عبارتند :

*بررسی و تشخیص علت مشکلاتی مثل درد مداوم قسمت فوقانی شکم تهوع استفراغ اشکال در بلع و یا سوزش سر دل

*خارج کردن جسم خارجی از دستگاه گوارش

*تشخیص ناهنجاری مری معده یا دوازده و نیز تومور یا سرطان های که در مراحل اولیه هستند.

*انجام نمونه برداری و تشخیص تومور بدخیم از تومور خوش خیم

*تشخیص عفونت هیلکو باکتریالوری

حین آندوسکوپي چه اتفاقی می افتد

جهت انجام آندوسکوپي شما را به صورت خوابیده به پهلوی چپ قرار داده می شوید پزشک سر آندوسکوپي را روی زبان شما قرار داده و آن را به سمت گلو می برد و از شما می خواهد که آن را قورت دهید با این کار مری باز شده و آندوسکوپ داخل میشود و سپس به سمت پایین و معده میرود وقتی سر آندوسکوپ وارد معده شد از طریق یک لوله که در آندوسکوپ قرار دارد معده باد می شود تا مشاهده داخل آن بهتر انجام شود در صورت مشاهده موارد مشکوک پزشک ممکن است اقدام به نمونه برداری (تکه برداری یا بیوپسی) نماید که این کار کاملاً بدون درد میباشد وقتی کار پزشک تمام شد آندوسکوپ به بیرون کشیده می شود .