

سقط عمدی (ختم بارداری)

با دارو یا عمل جراحی قبل از زمانی است که جنین بتواند زنده متولد شود :

این سقط به دو دسته تقسیم میشود :

۱- سقط درمانی : سقط درمانی یکی از انواع سقط جنین بوده که با تأییدیه پزشکی قانونی انجام میشود.

۲- سقط غیر قانونی : در واقع توسط پزشک غیر مسول وبا استفاده از امکانات غیرقانونی صورت میگیرد که مورد تایید قانون کشور نیست اینگونه سقطها با عوارض بسیار شدید همراه هستند نظیر: عفونت ، شوک ، خونریزی های شدید

خونریزی واژینال در دوران بارداری میتواند ناشی از عوامل زیر باشد:

۱ بچه خوره یا مول
۲ حاملگی خارج از رحم
۳ سقط جنین
۴ ضایعات بافت دهانه رحم

برای زن بارداری که دچار خونریزی شده است چه میتوان کرد ؟

در صورت وجود هرگونه خونریزی واژینال در دوران بارداری فوراً به پزشک مراجعه کند. در صورت لکه بینی بدون درد با پزشک مشورت کند. در صورت توصیه پزشک به استراحت در منزل به محض افزایش خونریزی یا ادامه خونریزی پس استراحت به بیمارستان مراجعه کند. در صورتی که گروه خون مادر منفی است بایستی پس از سقط آمپول رگام با مشورت پزشک تزریق شود .

تهیه شده توسط کارگروه آموزش به بیمار بخش لبر

Phone:023-31819412
15khordadhos.semums.ac.ir



بیمارستان ۱۵ خرداد مهدشهر

سقط جنین



کد پمفلت : Hos-Pam-OB-05

تاریخ ابلاغ : ۱۴۰۲/۱۲/۱

تاریخ بازنگری بعدی : ۱۴۰۴/۱۲/۱

سقط جنین

به ختم حاملگی زیر هفته ۲۰ یا جنینی که کمتر از پانصد گرم وزن دارد خودبه خودی یا القا شده سقط میگویند. شایع ترین علامت سقط خونریزی است. حاملگی سالم به حاملگی اطلاق میشود که جنین رشد تکامل خود را پیدا کرده و منجر به تولد نوزاد میشود سقط شایع ترین عارضه حاملگی در سه ماهه اول میباشد که موجب اضطراب شدید در زوجین میشود در واقع یکی از فوریت های زنان و مامایی است و عوارض جدی دارد از جمله:

خونریزی - عفونت - شوک باکتریال - خطر مرگ میر مادر

عوامل جنینی سقط شامل:

- الف- نمو غیر طبیعی تخمک در ۴۰٪ موارد منجر به عدم رشد و سقط خودبه خودی میشود
- ب- ناهنجاری ارثی و ژنتیکی جنین

عوامل مربوط به مادر در سقط :

- ۱- بیماری های عفونی مادر: سرخجه - تب مالت - عفونت های مقاربتی
- ۲- بیماری های مزمن ناتوان کننده مادر : سل - سرطان - افزایش فشارخون - بیماری کلیوی
- ۳- بیماری های غدد مادر : کم کاری تیروئید دیابت
- ۴- مصرف دارو و عوامل محیطی
- ۵- عدم پذیرش ایمنی بدن: جنین از لحاظ ژنتیک یک عامل خارجی برای بدن مادر است سیستم دفاعی علیه آن آنتی بادی ساخته و جنین را دفع میکند
- ۶- ناهنجاری رحم مادر: رحم دوشاخ ، فیبروم یا چسبندگی رحم
- ۷- نارسایی دهانه رحم : بازبودن بیش از حد رحم نکته: سقط در زنان پایین ۲۰ سال و بالای ۴۰ سال بیشتر است

انواع سقط :

زمانی که سقط خود به خود بدون استفاده از راه های دارویی یا مکانیکی تخلیه رحم صورت میگیرد به آن سقط خودبه خودی میگویند

سقط فراموش شده : جنین مرده و برای مدتی حتی ماه ها در رحم باقی مانده و هنوز دفع نشده است

سقط کامل: به دنبال خونریزی قبلی محتویات رحم کاملاً خارج شده است

سقط ناقض : دهانه رحم کاملاً باز بوده خونریزی زیاد و درد زیر شکم وجود دارد در این حالت مقداری از محصولات باقی مانده است

سقط غیرقابل اجتناب: بیمار سقط داشته و دهانه رحم باز میشود

تهدید به سقط: تعدادی خونریزی زنانه و دردشکمی بسیار کم علائم حاملگی پابرجا است

سقط مکرر: بیش از سه سقط پشت سرهم که احتمالاً علت مشترک دارند